

癌種		レジメン名			抗癌剤適応分類 (進行・再発、術前、術後など)
膵癌		オニハイト <sup>®</sup> +5FU+LV			進行・再発
番号	抗癌剤 (指定がある場合は前投薬・補液等) (欄不足時は別添可)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日(d1、d8など)
1	オニハイト <sup>®</sup> (CPT-11リポソーム製剤)	70mg/m <sup>2</sup> (UGT1A1野生・ヘテロ) 50mg/m <sup>2</sup> (UGT1A1ホモ・複合ヘテロ)	点滴	90分	Day1
2	レボホリナートカルシウム(I-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	Day1
3	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	Day1-3
4					
5					
6					
7					
8					
1コースの期間		2週間	総コース数		
主要文献 ※文献添付必要		承認条件は、Phase IIIの結果かつ保険適応を有するものとする。ただし、Phase IIの結果でも、学会が認めているものや、ASCOやESMOと同等の学会での発表は可とする。上記以外は原則、倫理審査委員会にかけて審議することとする。			
		NAPOLI-1試験。 Wang-Gillam A, et al. Lancet. 2016;387(10018):545-557.			
その他		化学療法委員会で審議			

松阪市民病院